

國內現行麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）預防接種建議

107.4.21

一、有較高麻疹感染風險，優先接種建議對象：

| 對 象 | 接 種 建 議 | 諮 詢 評 估 及 接 種 地 點 |
|-------------------|--|--|
| 計畫前往有麻疹 疫情地區者 | 出生滿 6 個月至未滿 1 歲幼兒：於出國前評估接種需求，自費接種 1 劑，滿 12 個月後仍須按時程完成 2 劑公費接種（與前一劑至少間隔 4 週）。 | 各衛生所(疫苗自費) |
| | 滿 1 歲之學齡前幼兒：若已完成公費第一劑，可於出國前評估提前接種公費第二劑（與第一劑至少間隔 4 週）。 | 1. 各衛生所(台北市為聯合醫院 12 區附設門診部) 2. 預防接種合約院所 |
| | 1981 年(含)以後出生的成人，建議自費接種 1 劑後再行前往。 | 1. 提供自費 MMR 疫苗接種院所 |
| 工作性質會頻繁 接觸外國人者 | 1981 年(含)以後出生者，建議自費接種 1 劑。 | 2. 衛生福利部疾病管制署旅遊醫學合約醫院「旅遊醫學門診」 |
| 醫療照護人員 | 1. 不具有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，建議應接種 2 劑，且間隔至少 4 週。 2. 優先針對 1981 年(含)以後出生者，未持有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，得接種 1 劑。 | |

二、常規建議接種對象：

| 對 象 | 接 種 建 議 | 諮 詢 評 估 及 接 種 地 點 |
|---------------------|---|--|
| 幼兒常規接種 | 出生滿 12 個月及滿 5 歲至入國小前各公費接種一劑。 | 1. 各衛生所(台北市為聯合醫院 12 區附設門診部) 2. 預防接種合約院所 |
| 11 至 18 歲青少 年，成人 | 未曾接種、接種史不清楚者或檢驗未具麻疹抗體者，應自費完成 2 劑，且間隔至少 4 週。 | 1. 提供自費 MMR 疫苗接種院所 2. 衛生福利部疾病管制署旅遊醫學合 |

| 對象 | 接種建議 | 諮詢評估及接種地點 |
|-----------|--|--|
| | | 約醫院「旅遊醫學門診」 |
| 育齡婦女及外籍配偶 | <p>一、本國籍育齡婦女：60年8月以前出生未曾感染過德國麻疹者，可接種1劑；60年9月以後出生者，出具經檢測德國麻疹抗體陰性之證明者，可公費接種1劑。</p> <p>二、外籍配偶：來台申請居留/定居且無德國麻疹相關疫苗接種證明者，或經檢測不具德國麻疹抗體出具證明者，可公費接種1劑。</p> <p>三、婦女於懷孕期間如經檢測未具麻疹或德國麻疹抗體，應避免前往麻疹或德國麻疹流行地區，並於產後儘速持德國麻疹抗體陰性證明，可公費接種1劑。</p> <p>四、德國麻疹抗體陰性育齡婦女，於準備懷孕前先施打MMR疫苗，接種疫苗後4週內應避免懷孕。</p> | <p>1.各衛生所(台北市為聯合醫院12區附設門診部)</p> <p>2.指定之預防接種合約院所</p> |